

## INFORMATIONEN FÜR PATIENT:INNEN / PFLEGESTATIONEN

### Verhalten nach medizinischer Anwendung offener radioaktiver Stoffe

Bei Herrn/Frau \_\_\_\_\_ geb. am \_\_\_\_\_

wurde am \_\_\_\_\_

eine **Untersuchung** mit offenen radioaktiven Stoffen vorgenommen:

Art der Untersuchung \_\_\_\_\_

Radiopharmazeutisches Arzneimittel: \_\_\_\_\_

Aktivität: \_\_\_\_\_ MBq

Patientendosis

(effektive Dosis nach Standardberechnung s. ICRP und ICRP 62 Ad. 1): \_\_\_\_\_ mSv

Bei Rückfragen Tel. \_\_\_\_\_

Nach der Untersuchung können Reste von Radioaktivität in Hygieneartikeln wie z. B. Vorlagen und Windeln oder in Gegenständen wie Kathetern, Urinbeuteln und Venenverweilkanülen vorhanden sein. Diese möglicherweise mit Radioaktivität verunreinigten Artikel sollten erst nach einer Abklingzeit von 2 Tagen in den normalen Hausmüll gegeben werden.

Bis 6 Stunden nach Untersuchung sollte ein enger körperlicher Kontakt mit Schwangeren und Kindern vermieden werden.